

DOKAZIVANJE *TRICHOMONAS VAGINALIS* – NATIVNI PREPARAT
IZOLACIJA *TRICHOMONAS VAGINALIS* – KULTIVISANJE

Uputstva za uzimanje i transport uzoraka

Bris vagine

Uzorak uzeti sa vaginalne sluznice, uz rotiranje brisa. Transportovati na 37 °C u prethodno zagrajenom (na 37 °C) fiziološkom rastvoru (0,5ml) ili Diamond medijumu (5ml), do 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

Ispirak vagine

Ispirak vagine transportovati u sterilnoj posudi na 37 °C, do 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

Bris cerviksa

Uzorak uzeti sa cervikalne sluznice, uz rotiranje brisa. Transportovati na 37°C u prethodno zagrajenom (na 37 °C) fiziološkom rastvoru (0,5ml) ili Diamond medijumu (5ml), do 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

Bris uretre

Uzorak uzeti sa uretralne sluznice, uz rotiranje brisa. Transportovati na 37°C u prethodno zagrajenom (na 37 °C) fiziološkom rastvoru (0,5ml) ili Diamond medijumu (5ml), do 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

Urin

Uzeti prvi jutarnji mlaz urina i transportovati u posudi za urin, na 37°C u roku od 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

Eksprimat prostate

Eksprimat prostate transportovati u posudi za urin, na 37°C u roku od 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.